

<b>1) Výrazně masný typ prasat prezentuje plemeno:</b>	
A české bílé ušlechtilé	
B česká landrase	
C pietrain	
<b>2) Prasničky se zapouští ve věku:</b>	
A 180 dní	
B 200 dní	
C 230 dní	
<b>3) Optimální délka mezidobí u prasnic je:</b>	
A 120–130 dní	
B 150–160 dní	
C 160–180 dní	
<b>4) Plodnost je vlastnost s dědivostí (<math>h^2</math>):</b>	
A nízkou	
B střední	
C vysokou	
<b>5) Finální hybridi prasat dosahují jatečnou hmotnost ve věku:</b>	
A 6 měsíců	
B 8 měsíců	
C 10 měsíců	
<b>6) V pozici otce finálního hybridu prasat se používají plemena šlechtěná na:</b>	
A vysokou plodnost a vysoký podíl svaloviny	
B vysoký podíl svaloviny	
C vysokou plodnost	
<b>7) Mezi hlavní masité části se u prasat řadí:</b>	
A kýta, pečeně, plec, krkovička	
B kýta, pečeně, plec, krkovička, bok	
C kýta, pečeně, plec, bok	
<b>8) Plemeno duroc má:</b>	
A vzpřímené ucho, červeno-rezavou barvu těla	
B poloklopené ucho, červeno-rezavou barvu těla	
C klopené ucho, černobílou barvu těla	
<b>9) Termoregulace je u selat plně vyvinuta:</b>	
A po narození	
B ve věku 21 dní	
C ve věku 35 dní	
<b>10) Selata jsou ustájena v dochovně:</b>	
A od narození do 30–35 kg	
B od 8 kg do 30–35 kg	
C od 15 kg do 30–35 kg	
<b>11) Pomocné míry pro odhad podílu svaloviny jsou:</b>	
A tloušťka tuku	
B tloušťka svalu	
C tloušťka tuku a tloušťka svalu	
<b>12) Mezi velká plemena krůt nepatří:</b>	
A standardní bronzová	
B bílá virginská	
C širokoprsá bílá	
<b>13) Při tvorbě kuřecích brojlerů se vychází z plemen:</b>	
A plymutka bílá a plymutka žíhaná	
B plymutka bílá a kornyška bílá	
C plymutka bílá a rodajlendka bílá	

<b>14) Do snáškových hybridů slepic nepatří:</b>	
A	ISA hnědá
B	Bovans hnědý
C	ROSS 308
<b>15) Délka snáškového cyklu nosných slepic v intenzivním chovu je:</b>	
A	34–40 týdnů
B	24–35 týdnů
C	48–64 týdnů
<b>16) U samic ptáků je vyvinut:</b>	
A	levý i pravý vaječník a vejcovod
B	levý vaječník a levý vejcovod
C	pravý vaječník a pravý vejcovod
<b>17) Podskořápečné blány vznikají v:</b>	
A	nálevce vejcovodu
B	krčku dělohy
C	děloze
<b>18) Číslo 3 na skořápce konzumních vajec značí chov:</b>	
A	výběhový
B	klecový
C	na podestýlce
<b>19) Krocani velkého typu se vykrmují do porážkové hmotnosti až:</b>	
A	10 kg
B	15 kg
C	25 kg
<b>20) Nejnižší teplotu prostředí po vyklubání mají:</b>	
A	kuřata
B	housata
C	krůťata
<b>21) Inseminace se nejvíce používá v chovu:</b>	
A	slepic nosného užitkového typu
B	slepic masného užitkového typu
C	krůt
<b>22) Doba inkubace slepičích vajec je:</b>	
A	21 dní
B	28 dní
C	35 dní
<b>23) Délka březosti králíka je:</b>	
A	27–35 dní
B	25–27 dní
C	35–36 dní
<b>24) Do genetických zdrojů králíků nepatří plemeno:</b>	
A	moravský modrý
B	moravský bílý hnědooký
C	kuní velký
<b>25) Činčila pravá rodí mláďata:</b>	
A	osrstěná, vidoucí, slyšící
B	holá, nevidoucí, neslyšící
C	osrstěná, nevidoucí, neslyšící